

MORTAL 2.5 EO

Bromadiolone 2,5g/L



RATICIDE LIQUIDE POUR PREPARATION D'APPÂTS



PHYTOSANITAIRES - MATERIELS DE TRAITEMENTS - SEMENCES - ENGRAIS

Rivière Palmerale, Rond Point ADO - 01 BP 420 ABJ 01 - Tél.: 27 22 49 22 83
 Cel.: 07 58 94 93 10 - 07 77 70 10 03 - E.mail: phytotop@phytotop.net

ABIDJAN - Cel.: 07 67 46 77 84	SAN-PEDRO - Cel.: 07 09 56 69 62	GAGNOA - Cel.: 07 09 56 69 87	DALOA - Cel.: 07 77 70 10 01
KORNOGO - Cel.: 07 77 70 09 99	DUKOUÉ - Cel.: 07 77 70 10 00	DIVO - Cel.: 07 09 79 31 28	ARENGOUR - Cel.: 07 77 74 83 79
DAOUKRO - Cel.: 07 01 36 12 39	YAKRO - Cel.: 07 59 41 49 19		

PhytoTop

MORTAL 2.5 EO

Bromadiolone 2,5g/L

FORMULATION : EO (Emulsion de type huileux)

USAGE :

MORTAL 2.5 EO est un raticide liquide pour préparation d'appâts.

MORTAL 2.5 EO est destiné à la préparation d'appâts pour éliminer les rongeurs (rats et souris) en hygiène publique, domicile, en plantation (palmier à huile, cocotier, maïs, arachide etc...) et dans les magasins de stockage de denrées agricoles (céréales, cacao café, etc.).

DOSE D'APPLICATION :

0.02L pour 1kg d'appâts. Soit : 20 ml de MORTAL 25EO pour 1kg d'appâts ou 2L de MORTAL 2.5EO pour 100kg d'appâts raticides.

MODE DE PREPARATION DES APPATS :

- Il faut mélanger de manière homogène la solution de MORTAL 2.5 EO et l'aliment servant d'appâts selon les proportions indiquées plus haut. On peut y ajouter de l'huile rouge pour faciliter le mélange et rendre l'appât encore plus attrayant et appétant pour les rongeurs.
- Il faut emballer les appâts ainsi obtenus dans des sachets de 25 à 50 g.

NB: Il est recommandé de varier régulièrement l'aliment servant d'appâts (riz, maïs, arachides, mie de pain, cossette de manioc etc...) afin de maintenir son attrait et son appétence pour les rongeurs ciblés.

PRECAUTIONS A PRENDRE :

Lors de la préparation, il faut se protéger, porter des gants et éviter tout contact du produit avec la peau, la bouche et les yeux.

POSE DES APPATS :

Il faut disposer à l'aide des gants, les sachets d'appâts dans les zones fréquentées par les rongeurs.

- En Hygiène publique : 1 sachet par m²
- En plantation : 1 à 2 sachets tous les 2 à 3m.

Observer régulièrement les appâts et remplacer ceux qui sont mangés ou entamés par les rongeurs.

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE : 1L et 5L

ANTIDOTE

Vitamine K1

N° HOMOLOGATION : 22 2818 In